

Syll. VI, p. 659, quantum e descriptionibus dijudicare liceat, non est nisi *Coniophorella olivacea* (Fr.) Karst. Finl. Basidsw. p. 438. Fungus quoad colorem ex aetate mire mutatus: initio subsulphureus, dein fulvo olivaceus, demum obscure olivaceus. Sporae siccando contrahuntur, unde curvatae et apicibus auctatae evadunt.

*Pistillaria cylindracea* Karst. n. sp. — Receptacula linearia vel cylindracea, laevia, obtusiuscula, glabra, alba, dein (praecipue siccando) flavescentia, recta, stipite vix distincto, 4—5 mm alta. Sporae ellipsoideae vel ovoideae, 6—10 = 3—5 mmm. — In petiolis foliorum Alni incanae putridorum ad Mustiala, m. Oct. — Granula calcarea continet.

*Pistillaria fulvida* Karst. n. sp. — Receptacula cylindraceo-clavulata, laevia, glabra, fulvescentia, basi brunnescentia, circiter 2 mm. alta, stipite non distincto. — Ad folia Corni sanguineae putrida in Mustiala m. Oct.

*Discinella* n. gen. — Est *Discina* Fr. em. apotheciis minoribus. Complectitur species plures *Humariae* Sacc. Syll.

*D. corticalis* Karst. n. sp. — Apothecia vulgo caespitosa, breviter stipitata vel sessilia. Cupula ceraceo carnosa, convexa versus marginem leviter deflexa, siccitate plana vel subconcava, margine anguste membranaceo, pallida, praecipue versus marginem squamulis subtilissimis adpressis fuscouscentibus obsessa, sicca fuscescens, epithecio rufescente pallido, dein albido-pallente vel siccitate rufescente, excipulo filamentis flexuosis, intricatis, 5—7 mmm. crassis composito, latit. circiter 3 mm. Stipes perbrevis, crassus vel fere nullus. Asci cylindracei, jodo vino rubentes, octospori, circiter 135 = 12 mmm. Sporae monostichae, late ellipsoideae, laevissimae, eguttulatae, 12—13 = 8 mmm. Paraphyses filiformes, apice vix vel leviter incrassatae, ramosae, ascos aequantes, 1—2 mmm. crassae. — Ad trunco corticatos emortuos Lonicerae tataricae in horto Mustialensi, m. Oct. 1891.

*Pestalozzia inquinans* Karst. n. sp. — Acervuli epiphylli, macula orbiculari, expallente, fuscescente cincta, 1,5 cm. lata insidentes, erumpenti-superficiales, subsphaeroidei, ovoidei vel tereti oblongati, punctiformes, foedentes, nigri. Conidia fusoideo-oblongata, recta, 4-septata, loculis intermediis dilutissime fuligineis, pellucidis, terminalibus conoides, acutatis, hyalinis, 16—18 = 6—7 mmm., ciliis apicalibus 2, rarissime 1 vel partitione 3, divergentibus, subaequalibus, hyalinis, 15—35 mmm. longis. — In foliis vivis Ca-