

Hyalodidymae Sacc.**Apiospora** Sacc.

** 341) **Apiospora Budleiae** n. sp. — (Tab. II, Fig. 5-7).

Peritheciis ellipsoideis, sparsis, interdum bi adproximatis, forte rostratis, excipulo crasso nigroque, 399-394 μ diam.; ascis pseudo-paraphysatis, angustioribus longiusculisque, cylindraceis, parce pediculatis, sursum rotundatis, supra parce constrictis, achrois, 73 \times 7,8 μ ; sporulis monostichis, ellipsoideis, untrique acutiusculis, propinque basi uniseptatis, plerumque triguttulatis, hyalinis, 16,9-20,8 \times 3,5-3,9 μ .

In ramulis siccis *Budleiae* sp., pr. Serra de Montejunto (Alenquer), leg. Teixeira de Vasconcelos, septembri, 1953.

Sociis *Eutypella Budleiae* n. sp. et *Lophidium Budleiae* n. sp.

HYPOCREACEAE De Not.**Scolecosporae** Sacc.**Claviceps** Tul.

Claviceps microcephala (Wallr.) Tul. — (*Fg. Lusit.*, IV, 24).

In caryopsidibus *Phragmites communis* Trin., pr. Sacavem (in Horto Stationis Agronomicae Nationalis), leg. Bento Rainha, decembri, 1954.

Obs.: stipite 10-16 mill. long.

LOPHIOSTOMACEAE Sacc.**Dictyosporae** Sacc.**Lophidium** Sacc.

** 342) **Lophidium Budleiae** n. sp. — (Tab. II, fig. 1-4).

Peritheciis sparsis rareque geminatis, plus minusve ellipsoideis, forte rostratis (interdum acutatis vel crasso cuneatis), excipulo corpulento nigroque, 365-500 μ ; ascis numerosis, pedicellatis, supra rotundatis, nimis paraphysatis, achrois, 117-143 \times 10-15,6 μ ; paraphysibus longiusculis, cylindraceis, incoloribus; sporulis ellipsoideis, rectis curvulisve, transverse 5-7 longitudina literque 1-4 septatis, irregulariter dispositis, luteolis, 26-33,5 \times 7,8-10,4 μ .

In ramis siccis *Budleiae* sp., pr. Serra de Montejunto (Alenquer), leg. Teixeira de Vasconcelos, septembri, 1953.

Sociis *Eutypella Budleiae* n. sp. et *Apiospora Budleiae* n. sp.

TAB. II

