


Coccomyces atactus ???



Apothécies circulaires (0,5-1,5 mm de diamètre pour 0,2-0,4 mm de hauteur) sessiles sur un fin stroma commun et noir, s'ouvrant par la déchirure d'un couvercle noir (40-50 μm d'épaisseur) qui laisse 8-10 dents irrégulières noirâtres à l'extérieur et blanchâtres du côté de l'hyménium. Hyménium gris-jaunâtre à jaunâtre.


Spores mesurées dans l'eau : 28,4-**36,5**-42,2 x 2,7-**3,3**-4,1 μm (n= 20) (moyenne en gras)

Spores lisses, hyalines, avec des gouttelettes huileuses, sans septa, fusiformes allongées, droites à courbées, à extrémités arrondies, présence d'un manchon gélatineux peu évident..

Asques inoperculés, clavés et pédicellés jusqu'aux 2/3 de leur longueur : 120-150 x 12,1-17,7 μm , l'apex est aigu, aucune réaction au lugol ou au Melzer (et appareil apical absent ?), octosporés.

Poils périphysoïdes absents (non vus)

Paraphyses simples, quelquefois septées à apex à peine élargi jusqu'à 2,8-3,9 μm



Spore (eau)



Sommet d'asque



Asque (Eau)

Sur écailles de cônes de *Picea abies*, le 4 octobre 2013, Bois de Lacou (Saint-André-en-Vivaraïs, Ardèche) ; Exsiccata FF13098.