

10. **L. Luzulae** Lib. Exs. 75. — F. rh. 194. — An trockenen Blättern von *Luzula maxima*, häufig, im Herbst. Um Oestrich.

11. **L. pinastri** Desm. Ann. sc. nat. 1843. XIX. p. 338. — An abgefallenen und faulenden Nadeln von *Pinus sylvestris*, sehr selten, im Frühling. Bei Freienweihem.

**73. Gloeosporium** Desm. & Montagne in Syll. p. 195.

1. **G. Betulae** †. — F. rh. 1650. — Peritheciis erumpentibus, in laciniis 2—4 laceratis, depressis, atris; stylosporibus in sterigmatum tenuissimorum apicibus, cylindraceis, utrinque obtusis, rectis, continuis, 14 Mik. long., 2 Mik. lat., hyalinis. Tab. I. Fig. 32. stylospor.

An trockenen, noch hängenden Blättern von *Betula alba*, sehr selten, im Herbst. Am Bachweg im Oestricher Wald.

2. **G. Sanguisorbae** †. — F. rh. 1651. — Hypophyllum. Peritheciis (?) erumpentibus, gregariis, in macula fusca, punctiformibus, hemisphaericis, siccis concavis, fuscis; stylosporibus oblongis, simplicibus, 8 Mik. long., 4 Mik. crass., hyalinis. Tab. I. Fig. 34. stylospor.

An lebenden Blättern von *Sanguisorba offic.*, selten, im Herbst. Auf den Rheinwiesen bei Oestrich.

3. **G. Veronicarum** Ces. in Rbh. F. eur. 97. — F. rh. 198. — An lebenden Blättern von *Veronica offic.* und *hederaefolia*, nicht selten, im Sommer. Um Oestrich.

4. **G. Castagnei** Mont. Ann. sc. nat. 1849. XII. p. 295. — F. rh. 200. — An lebenden Blättern von *Populus alba*, häufig, im Herbst. Auf der Münchau bei Hattenheim.

**74. Epidochium** Fries S. v. Sc. p. 471.

1. **E. nigricans** Fr. S. v. Sc. p. 471. — F. rh. 1280. — An trockenen Aesten von *Tilia parvifolia*, häufig, im Herbst.

**75. Hymenula** Fries Syst. myc. II. p. 233.

1. **H. rubella** Fr. El. II. p. 38. — An trockenen, feuchten Blättern von *Carex paludosa*, selten, im Frühling. Bei Oestrich.

**76. Tricholeconium** Corda Ic. I. p. 17.

1. **T. roseum** Cd. Ic. I. 17. Tab. 4. Fig. 239. — F. rh. 185. — An trockenen Stengeln von *Ballota nigra*, selten, im Frühling. Um Oestrich.

**77. Sarcopodium** Ehrenberg in Fr. S. v. Sc. p. 471.

1. **S. follicolum** †. — F. rh. 1645. — Stromate hemisphaerico, vix acus capitis magnitudine, cinnabarino, gelatinoso, ciliis candidis septatis circi-

nato, in foliorum macula expallescens nidulante; conidiis cylindraceis, rectis vel perparum curvatis, continuis, hyalinis.

An der unteren Seite lebender Blätter von *Mercurialis perennis*, sehr selten, im Sommer. Auf dem Rabenkopf bei Oestrich. An den trockenen Blättern erscheint es später häufiger.

2. **S. circinatum** Ehrh. Sylv. Ber. p. 23. Fig. 4. — F. rh. 1644. — An trockenen Stengeln und Wurzeln von *Medicago sativa* u. *Onosma arenarium*, selten, im Winter. Bei Oestrich und Budenheim.

**78. Periola** Fries Syst. myc. II. p. 266.

1. **P. tomentosa** Fr. Syst. myc. II. pag. 266. — F. rh. 203. — An faulen Knollen von *Solanum tuberosum*, in Kellern, gemein, im Winter.

**79. Chaetostroma** Corda Ic. II. p. 32.

1. **C. pedicellatum** Prss. in Linn. 1851. 24. 160. — F. rh. 1534. — An faulenden Blättern von *Vitis vinifera*, sehr selten, im Frühling. Bei Oestrich.

**80. Fusarium** Link Spec. II. p. 104.

1. **F. stercoris** †. — F. rh. 1921. — Tenuissime late effusum, roseum. Hyphis ramosis, continuis; conidiis fusiformibus, curvatis vermicularibusve, 2—4-septatis, hyalinis, 60 Mik. long., 6 Mik. crass.

Auf feuchtem Dünger von Truthühnern, selten, im Frühling. Oestrich.

2. **F. larvarum** †. — Tuberculis punctiformibus, orbicularibus, convexis, rubris, basi cum floccis sparsis, candidis cinctis; conidiis fusiformibus, curvatis, 1—3-septatis, 24 Mik. long., 5 Mik. crass., hyalinis. Tab. I. Fig. 36. conid.

An Puppenhüllen von ausgeschlüpften Insecten, im Frühling. Bei Oestrich, an Aepfelbäumen.

3. **F. nervisequum** †.

a. *Platani* †. — F. rh. 427. — Hymenula *Platani* Lév. in Desm. Exs. 1349. — Tuberculis liberis, adnatis, rotundatis, ovatis oblongisve, planis, rugulosis, in macula exarida seriatim dispositis, fuscis, demum aterrimis, longitudinaliter dehiscentibus; conidiis oblongo-ovatis, hyalinis, 12 Mik. long., 4 Mik. crass. Tab. I. Fig. 37. conid.

An den lebenden Blättern, die Blattrippen verfolgend, von *Platanus orient.*, oft sehr häufig und das frühe Abfallen der Blätter bewirkend, im Sommer.

b. *Quercus*. — F. rh. 428. — An lebenden Blättern von *Quercus*, sehr selten, im Sommer. Im Oestricher Wald.

4. **F. violaceum** †. — F. rh. 209. — Tuberculis late effusis, amoene violaceis; conidiis fusiformibus, bi—triseptatis, curvatis, 24 Mik. long., 6 Mik. crass., hyalinis.

An faulen Knollen von *Solanum tuberosum*, meist auf *Periola tomentosa* schmarotzend, sehr selten, im Frühling. Oestrich in Kellern.