

Miélan (32), près du lac

leg. G. Corrieol

10/09/2015

Sur une rive exondée, sur terre nue et débris ligneux (*Salix alba*), plusieurs spécimens.


Apothécies étalées, disciformes, à hyménium ridé/bosselé, brun purpurin à brun foncé; surface externe concolore, adhérente au substrat.  $\varnothing$  mm. Pas de latex.

Sous-hyménium de *t. intricata*. Excipulum médullaire de *t. globulosa*, à cellule de  $\varnothing$  20-50 $\mu$ , mêlées d'hyphes plus allongées parfois à artide renflés. Excipulum ectal de *t. globulosa* à cellules de  $\varnothing$  similaire.

Aspores cylindriques, atténués à la base, avec crochet, octosporés, 230-250 x 12-15  $\mu$ , à sommet et paroi bleuissant dans IKI

Paraphyses filiformes, non ou très peu élargies au sommet.  $\varnothing$  4-5  $\mu$  pigment brun intercellulaire

Spores ellipsoïdes, hyalines, biguttulées, à surface ornées d'un réticule  $\pm$  complet, très fin et très bas, faiblement coloré dans le BC, (13.3) 13.8 - 15.7 (16) x (7.2) 7.6 - 8.5  $\mu$ , Q = 1.8



Peziza

dupli GC15091003

2015.09.09